A

vertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Z.I. NORD 8.P. 177 21205 BEAUNE Cédex

ABONNEMENT ANNUEL 290 F. Hégisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 3 500 28 D.

■ EDITION GRANDES CULTURES I



25 80.26.35.45

Bulletin nº 25 - 26 octobre 1994

COLZA

Renouvellement insecticide inutile.

CEREALES

Limaces: A surveiller dans les terres motteuses. **Cicadelles**: Traitement inutile à l'heure actuelle.

Pucerons : Surveiller les parcelles au stade début tallage.

Désherbage : Tenir compte du stade des dernières levées pour intervenir.

COLZA

STADE: 5-10 feuilles.

Ravageurs

Depuis le 18/10 les piégeages de charançon du bourgeon terminal sont en très forte régression. Les populations de pucerons sont toujours faibles et souvent en baisse.

PRECONISATION: Un renouvellement du traitement insecticide est inutile.

CEREALES

STADE : De levée en cours à début tallage.

Limaces

Les conditions météorologiques redeviennent favorables à ce ravageur.


PRECONISATION: N'hésitez pas à renouveler la protection dans les zones motteuses et/ou en bordure de parcelles, notamment s'il y a eu dégâts en 93. En cas de doute, poser des pièges (appâts sous une tuile ou un plastique noir) pour estimer l'importance de la population présente.

Cicadelles et pieds chétifs

Les captures en cuvette restent faibles (< 10 individus) dans la plupart des situations. Elles ont cependant pu être plus élevées (jusqu'à 70 captures) au cours de la semaine écoulée notamment dans des situations abritées, se réchauffant rapidement, à proximité de bois, de chaumes,.... Les pluies et la baisse des températures prévues limitent fortement les risques.

PRECONISATION: Le traitement ne se justifie pas avec les conditions climatiques annoncées.

Pucerons et JNO



Un vol important de Rhopalosiphum padi a été enregistré à la tour d'Auxerre du 11 au 21 octobre. Ces pucerons se sont installés sur les repousses, sur les graminées sauvages et/ou en culture. Le taux de plantes porteuses a légèrement augmenté depuis la semaine dernière sur les parcelles à 3 feuilles ou plus : il reste faible (0 à 7 %) et en-dessous du seuil de traitement : leur multiplication est limitée par les conditions climatiques.

Le pouvoir virulifère des pucerons s'est jusqu'alors révélé négatif lors des analyses réalisées à Beaune :

Semaine d'exposition	% de pots porteurs	% de pots infestés par le virus
22/09 - 28/09/94	0	0
28/09 - 05/10/94	43	0
05/10 - 12/10/94	45	O

PRECONISATION : Aucun traitement justifié actuellement.

Désherbage

L'irrégularité des levées sur les parcelles semées première quinzaine d'octobre, doit inciter à la vigilance pour le choix de la date de désherbage, afin d'éviter des problèmes de sélectivité.

PRECONISATION Prendre le stade des dernières levées de la parcelle comme référence pour intervenir avec isoproturon, chlortoluron,....